

[J Biol Regul Homeost Agents](#). 2015 Jul-Sep;29(3 Suppl 1):19-22. **IMPLANTS INSERTED IN POST EXTRACTIVE SOCKETS HAVE SURVIVAL RATES SIMILAR TO FIXTURES INSERTED IN HEALED BONE: A CASE SERIES STUDY.** [Corradini G<sup>1</sup>](#), [Delle Donne U<sup>1</sup>](#), [Boni W<sup>1</sup>](#), [Tettamanti L<sup>2</sup>](#), [Tagliabue A<sup>2</sup>](#).

*Parole chiave: impianti, postestrattivo, protesi/protesico, alveolo*

**L'inserimento di impianti postestrattivi (*immediati*) hanno un tasso di sopravvivenza implantare simile a quello degli impianti (*dilazionati*) in osso guarito: Studio su un certo numero di casi.**

Gli impianti postestrattivi (PEI) hanno riscontrato un ampio successo poiché riducono le varie fasi chirurgiche e migliorano la compliance\* del paziente. Lo scopo del presente studio è di elaborare uno studio retrospettivo su 2.273 impianti postestrattivi per valutare il loro tasso di sopravvivenza. Nel periodo compreso tra Gennaio 2008 e dicembre 2013, 877 pazienti (498 femmine e 379 maschi) sono stati operati presso lo studio odontoiatrico BDD (Milano, Italia). Il follow-up post-operatorio medio è stato di  $30 \pm 17$  mesi (max min, 84 - 1). Sono stati analizzati per questo studio duemiladuecentosettantatre impianti postestrattivi di EDIERRE Implant System SpA, Genova, Italia. Tutti i pazienti sono stati sottoposti allo stesso protocollo chirurgico e hanno accettato di partecipare ad un programma di check-up post-operatorio. È stato utilizzato per l'analisi statistica il programma SPSS. Il tasso di sopravvivenza (SVR) è stato del 97,7% con una perdita di soli 53 impianti su un totale di 2.273 impianti. Da un punto di vista statistico, l'incrocio dei dati tra fallimenti e tempistica di inserimento ha dato dei valori significativamente più elevati di fallimento nel caso di carico immediato ( $p = 0,013$ ). Ci sono stati 26 fallimenti su 761 impianti a carico immediato contro 27 fallimenti implantari su 1.485 impianti a carico differito. L'inserimento di impianti postestrattivi è una procedura affidabile. Tuttavia, particolare attenzione da parte dei clinici dovrà essere posta per quei casi che possono richiedere l'inserimento immediato.

**\*Compliance del Paziente (o adesione del Paziente):**

Indica il grado di adesione (detto 'alta' o 'bassa' compliance) del paziente alla prescrizione del medico. La Persona capace di intendere e volere (oppure il suo tutore legale) è in pieno diritto di accettare e rifiutare qualsiasi proposta medica o infermieristica, in ambito sanitario e/o assistenziale.